





النشرة البيئية



يصدرها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الصيدلة - جامعة أسدوط يناير ۲۰۲۳

تحت رعاية

أ.د. أحمد محمد كمال المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أ.د. مها كامل غانم عمر

نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية

أ.د. أحمد محمد أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة

أ.د. محمد محمود محمد عبد اللطيف

وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أدوية البرد والإنفلونزا

مقدمة :-

البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا خاصة في فصل الشتاء، عادةً ما تكون الأعراض متشابهة مثل: الرشح، العطس، الكحة، الصداع، وارتفاع الحرارة الأدوية المتاحة لا تعالج الفيروس نفسه، لكنها تخفف الأعراض وتُسرّع من الشفاء.



- من أهمها: الباراسيتامول والإيبوبروفين.
 - تعمل على تقليل الصداع وآلام الجسم.
 - تخفض درجة الحرارة المرتفعة

BRUFEN® 400













۲ - مضادات

الاحتقان



- مثل: كلورفينيرامين، لوراتادين، سيتريزين.
 - تقلل العطس وإفرازات الأنف.

لمرضى الضغط

بعض الأنواع تسبب النعاس، لذا يُفضل تناولها







محاذير مهمة

- تجنّب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية؛ فهي لا تعالج الفيروس.
- مرضى القلب والضغط والسكرى يجب استشارة الطبيب قبل تناول بعض الأدوية.
 - الأطفال وكبار السن يحتاجون جرعات خاصة وتوجيه طبي.

كيفية الاتصال بنا:

مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - البني الإداري الدور الثالث - كلية الصيدلة - جامعة

آسیوط (ت داخلی: ۱۵٤۷)

Faculty of Pharmacy, Assiut University, Assiut, Egypt. Phone: 002-088-2411547, 002-088-2411303, Direct: 002-088-2345622, Fax.: 002-088-2345631





- فيتامين ٢ والزنك قد يساعدان في تقوية المناعة.
 - المشروبات الدافئة والراحة عامل مهم للشفاء.
 - شرب المياه بكثرة يمنع الجفاف.







- الكحة الجافة: ديكستروميثورفان.
- الكحة المصحوبة ببلغم: جوايفينيسين أو أدوية مذيبة للبلغم.
- يجب اختيار النوع المناسب حسب طبيعة الكحة.





- مثل أوسيلتاميفير (تاميفلو).
- تُستخدم فقط في حالات الإنفلونزا المؤكدة وبوصفة الطبيب
 - لا تُستعمل لعلاج نزلات البرد العادية.